

INFORMOVANÝ SOUHLAS S PODÁNÍM OČKOVACÍ LÁTKY Comirnaty injekční disperzi mRNA vakcína proti onemocnění COVID-19 (modifikovaný nukleosid)

Jméno a příjmení očkovaného :

Datum :

Datum narození :

Telefonní číslo (e mail) :

Vážená paní / Vážený pane,

projevil(a) jste zájem o očkování proti nemoci COVID-19. Bude Vám podána očkovací látka COVID-19 Comirnaty injekční disperze (dále jen „očkovací látka“), která je určena pro osoby od 12let věku.

Cílem očkování je zabránit vzniku onemocnění COVID-19, kterou způsobuje virus SARS-CoV-2. Stejně jako v případě jiných očkovacích látek, ani tato očkovací látka nemusí plně ochránit očkovaného proti nemoci. Posilující dávka pak významně zvýší ochranu proti nákaze a to intenzivněji a rychleji než předchozí dávky očkování.

Jde o STANDARDNÍ OČKOVACÍ SCHEMA/ POSILOVACÍ DÁVKU (nehodící se přeškrtně lékař)

Pokud i po přečtení této informace máte jakékoli další otázky, máte možnost konzultace s lékařem. Níže uvedený dotazník nám pomůže určit, zda by se očkování mělo provést nebo odložit. Pokud na některou z níže uvedených otázek odpovíte „ano“, neznamená to, že nemůžete být očkován(a).

- | | |
|---|-----------------|
| Cítíte se dnes nemocný(á) ? | ANO / NE |
| Je Vám nyní nařízena karanténa pro kontakt s nemocným COVID-19 | ANO / NE |
| Prodělal/a jste onemocnění COVID-19 nebo jste měl/a pozitivní PCR test ? | ANO / NE |
| Byl(a) jste někdy očkován(a) proti nemoci COVID-19 ? | ANO / NE |
| Měl(a) jste někdy vážnou alergickou reakci na očkování ? | ANO / NE |
| Máte nějakou krvácivou poruchu nebo berete léky na “ředění” krve ? | ANO / NE |
| Máte nějakou závažnou poruchu imunity ? | ANO / NE |
| Jste těhotná nebo kojíte ? | ANO / NE |
| Absolvoval(a) jste v posledních dvou týdnech nějaké jiné očkování ? | ANO / NE |

Očkovací látka Vám bude podána injekčně do svalů na rameni. Druhou dávku se doporučuje podat 21 - 23 dnů po první dávce. Posilovací dávka se pak podává nejdříve po 6ti měsících od ukončení standardního očkování. Možné bezprostřední reakce po očkování: Závažná alergická reakce po očkování (anafylaxe) je extrémně vzácná a může nastat po jakémkoli očkování. Někteří lidé mohou mít po podání očkovací látky alergickou reakci, která se může projevovat jako svědivá vyrážka, problémy s dýcháním, otok obličeje nebo jazyka. **V případě, že se u Vás taková alergická reakce vyskytne, neprodleně kontaktujte lékaře.** Bez včasné pomoci lékaře může dojít k újmě na zdraví, ve výjimečném případě může být pacient také ohrožen na životě. Je doporučeno po očkování setrvat 15 minut na místě, kde se očkování provádí. Pozdější možné reakce na očkování: Očkovací látka může vyvolat nežádoucí účinky. Jsou zpravidla lehké a odezní během několika málo dní. U více než jednoho očkovaného z deseti se může vyskytnout bolest nebo otok v místě vpichu injekce, únava, bolest hlavy, bolest svalů nebo kloubů, zimnice nebo horečka či průjem. U méně než jednoho očkovaného z deseti očkováných se může vyskytnout zarudnutí v místě vpichu injekce nebo pocit na zvracení. Vzácně či velmi vzácně se může vyskytnout letargie, zvětšení uzlin, vyrážka, malátnost, noční pocení, akutní alergická reakce, srdeční poruchy, otok končetiny. **Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, či jiné obtíže následující po očkování sdělte to svému lékaři.**

Podpisem potvrzuji, že jsem lékařem nezamlčel žádné informace o svém zdravotním stavu a rozumím poskytnutým informacím o očkování proti Covid -19, včetně informace o možných nežádoucích účincích.

Podpis (souhlas) očkovaného :